

Полевые измерения запасов углерода, интегральных и частных потоков диоксида углерода в лесных экосистемах проводятся с 2010 года. В последние годы лесные экосистемы стали нетто-источником диоксида углерода в связи с усыханием и распадом старых еловых древостоев. В работе принимают участие сотрудники отдела мониторинга потоков парниковых газов в природных и антропогенно-нарушенных экосистемах ИГКЭ Росгидромета - младший научный сотрудник А.С. Куманяев и старший научный сотрудник, доктор биологических наук Д.В. Карелин.

Подробнее: <http://www.igce.ru/2024/03/%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8/>

[D1%80%D0%B2% D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%](#)

[D1%81% D1% 82%D0%BE% D1%80%D0%B8%D1%8E%D0%BF%](#)

[D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8/](#)

[B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8/](#)